# Comportamientos suicidas en situaciones de internación psiquiátrica

## Suicidal behaviors in psychiatric inpatients

**María Martina Casullo**[1] **y María Josefina Scheinsohn**[2]

**RESUMEN**

Este trabajo analiza comportamientos suicidas (ideación e intento) y su relación con las variables edad, sexo, internaciones psiquiátricas, diagnóstico psicopatológico, motivo de la internación, en una muestra (N : 46) de pacientes adultos jóvenes (edad promedio 32 años) que fueron internados durante el año 2004 en situaciones de emergencia. Los casos estudiados están constituídos por un 76% de mujeres y un 24% de varones. El grupo de edad con mayor prevalencia de comportamientos suicidas en ambos sexos es el que se encuentra entre los 21 a 30 años.

Un 48% fue internado por intento de suicidio y un 24% por presencia de ideaciones suicidas. El 56% ha tenido internaciones previas y un 54% ha estado previamente en asistencia médica o psicológica. Entre las mujeres son más frecuentes los casos diagnosticados como Trastornos de Personalidad o Psicóticos, en tanto que en el grupo de varones predominan los Trastornos Psicóticos y los relacionados con el Abuso de sustancias.

**Palabras clave:**

Comportamiento suicida, Internación psiquiátrica, Diagnóstico.

---

1. Doctora en Psicología. Directora del Doctorado en Psicología. UP. Profesora. Facultad de Psicología. UBA. Investigadora principal CONICET. E-mail: casullo@psi.uba.ar

2. Lic. en Psicología. Profesora. Carrera de Médico Especialista en Psiquiatría. Facultad de Medicina USAL. Investigadora Proyecto UBACYT. Docente. Facultad de Psicología. UBA.

**Abstract**

Data on psychiatric inpatients are presented. (N:46; age M: 32 years old). Hospitalization (during year 2004) was due to the presence of a suicide intent (48%) or suicidal ideation (24%). Cases are composed by 76% of females and 24% of males. The highest prevalence of suicidal behavior for both sexes is represented by the patients between 21 to 30 y.o.

Women were mostly diagnosed as having a Personality or Psychotic Disorder, while among men higher frequencies of Psychotic Disorders or those related to Substance Abuse were found; 56% of the subjects have had previous hospitalizations due to the same problem and 54 % of them have received previously psychiatric or psychological assistance; 48% of the cases was committed due to suicidal intent and 24% because of suicidal ideation.

**Key words:**

Suicidal behavior, Psychiatric inpatients, Diagnoses.